

NO **1046** レジメン名 **PMT/CBDCA**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】 NSCLC・悪性胸膜中皮腫 1・アリムタ 500 mg/m² DAY1 2・カルボプラチン AUC4~5 DAY1 【カルバトートの式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】 21日1クール	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成21年10月1日 改訂
	45未満禁	95以上禁	1.8以上禁	
	カルバート使用			
	好中球基準	HGB基準	PLT基準	
	2000以上	9以上	100000以上	
	PS基準	前治療	年齢	
	0~2	1~2	20~75歳	

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
	パナビタン末 1g	1日1回		アリムタ投与7日前より最終投与から22日目まで連日投与	
①	メチコパール注(500μg)	2A 筋注		アリムタ投与7日前より最終投与から22日目まで9週毎に投与	オーダー(処方箋)で投薬
②	デキサート 6.6mg		1.5 本	★生食50mL	全開で点滴
③	アリムタ ()mg	500mg 100mg	本 本	生食100mL	②デキサート終了後~ 10分間で点滴
④	アロキシバック		1 本		③アリムタ終了後~ 30分で点滴
⑤	カルボプラチン「NK」()mg	450mg 150mg 50mg	本 本 本	5%ブドウ糖500mL	④アロキシ終了後~ 1時間30分で点滴
⑥	★生食50mL		1 本		⑤カルボプラチン終了後~ 全開で点滴

減量基準

★アリムタ前コースにて下記のいずれかを経験した場合は 500mg/m²→375mg/m² への減量を考慮すること。

- 白血球 1000未満。 ○好中球 500未満。 ○血小板 50000未満。
- 発熱を伴う好中球減少症。 ○Grade3以上の非血液毒性。(粘膜炎以外)
- Grade3以上もしくは入院を要する下痢。
- 副作用により次コースの開始が前コースの第30日以降に延期された場合。

★アリムタ前コースにて下記のいずれかを経験した場合は 500mg/m²→250mg/m² への減量を考慮すること。

- 血小板 50000未満で出血を伴った場合。 ○Grade2以上の神経毒性。
- Grade3以上の粘膜炎。(口内炎・消化管粘膜炎・結膜炎など)

クール数()

★49万円/21日1クール			★2時間30分							200910更新
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	投与中であるか確認	①(アリムタ投与7日前より) DAY-7								
		②③④⑤⑥ DAY1								
初回・2回目投与時はday15, 21に血算を考慮すること。										

クール数()

★49万円/21日1クール			★2時間30分							200910更新
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
		②③④⑤⑥ DAY1								