

NO 1047		レジメン名 BV+PAC(Weekly)/CBDCA	
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS
年齢	身長	体重	体表面積
歳	cm	kg	m²
【適応がん種】NSCLC(扁平上皮を除く)		PAC/CBDCA/BV	指示医師名
1・パクリタキセル 70 mg/m² DAY1. 8. 15 2・カルボプラチン AUC6 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】 3・アバスタチン 15 mg/kg DAY1		CCr補正 GOT補正 T-Bil補正 カルバート使用 WBC基準 HGB基準 PLT基準	〔病状〕 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 〔治療〕 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成22年2月2日 改訂
★アルコール含有説明要 28日(4週)1クール			
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)
① レスタミンコーワ5錠 内服 (前投与 オーダー不要)			② デカドロンと同時に内服
②	デキサメタゾン 6.6mg ファモチジン20mg	DAY1→ 3本 DAY8. 15→ 1.5本 1本	★生食50mL ①レスタミンコーワと同時に15分で点滴
③	グラニセトロン「NK」1mg (day1はアロキシバック)	1本	生食100mL ②デキサメタゾン終了後～30分で点滴
④	パクリタキセルNK()mg	100mg 本 30mg 本	▲5%ブドウ糖250mL ③終了後～1時間で点滴
⑤	カルボプラチン「NK」()mg	450mg 本 150mg 本 50mg 本	5%ブドウ糖500mL ④パクリタキセル終了後～1時間30分で点滴
⑥	生食50mL	1本	④パクリタキセル又は⑤カルボプラチン終了後～全開で点滴
⑦	アバスタチン()mg	400mg 本 100mg 本	生食100mL ⑥生食終了後～主・1時間30分で点滴
⑧	生食50mL	1本	⑦アバスタチン終了後～主・全開で投与
【1. 原則禁忌】 ●脳転移患者(脳出血のおそれ)、喀血(2.5mL以上の鮮血)既往患者 【2. 投与前必須検査】 ●投与前・後に血圧測定 BP180/120を超える場合は主治医へ報告 ●アバスタチン検査セット(●血液算定●T-Bil●GOT●GPT●ALP●ALB●Scr●CRP●尿蛋白測定●PT-INR●APTT●フィブリノーゲン●D-ダイマー)			
【看護師注意事項】 ○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用			
★67万円/28日1クール		★5時間/1時間45分/1時間45分	
月日	指示	指示医	受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施
	①②③④⑤⑥⑦⑧ DAY1		
	①②③④ ⑥ DAY8		
	①②③④ ⑥ DAY15		
	休み DAY22		