

NO	5007	レジメン名	Weekly TC						
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名			
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)			
		歳	cm	kg	m²	ml/min (mg/dl)			
【適応がん種】 卵巣K		PAC/CBDCA		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】		
1・パクリタキセル 80 mg/m ² DAY1. 8. 15				-	-	-	1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である		
2・カルボプラチン AUC1.5-2 DAY1. 8. 15 【カルバートの式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】				カルバート使用	-	-	【治療】		
★アルコール含有説明要 28日(4週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準	1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂		
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法				
① レスタミンコーワ5錠 内服 (前投与 オーダー不要)					② デキサメタゾン同時に内服				
②	デキサメタゾン 6.6mg	1.5 本	★生食50mL		①レスタミンコーワと同時に15分で点滴				
	ファモチジン20mg	1 本							
③	グラニセトロン「NK」1mg	1 本	生食100mL		②デキサメタゾン終了後～30分で点滴				
④	パクリタキセルNK()mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	③グラニセトロン終了後～1時間で点滴				
		30mg	本						
⑤	カルボプラチン「NK」()mg	150mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	④パクリタキセル終了後～1時間で点滴				
		50mg	本						
⑥	生食50mL	1 本			⑤カルボプラチン終了後～全開で点滴				
【看護師注意事項】									
○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用									
【外来時、嘔気強い場合、シンセロン錠投薬考慮】									
★23万円/28日1クール					★2時間45分		200807更新		
月日	指示		指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施						
	①～⑥		DAY1						
	①～⑥		DAY8						
	①～⑥		DAY15						
	休み		DAY22						