

NO 5008		レジメン名		Weekly TC-BV																	
病棟 患者番号 氏名		癌種		ステージ		PS		クール数		指示医師名											
		年齢		身長		体重		体表面積		GFR(血清クレアチニン値)											
		歳		cm		kg		㎡		ml/min (mg/dl)											
【適応がん種】卵巣K 子宮頸K PAC/CBDCA-BV						CCr補正		GOT補正		T-Bil補正		【病状】									
1・パクリタキセル 80 mg/㎡ DAY1. 8. 15						-		-		-		1 全て説明している									
2・カルボプラチン AUC1.5-2 DAY1. 8. 15 【カルバートートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】						-		-		-		2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない									
3・アバステン 15 mg/kg DAY1						カルバート使用		-		-		3 未告知である									
★ アルコール含有説明要 28日(4週)1クール						WBC基準		HGB基準		PLT基準		【治療】									
						-		-		-		1 抗癌剤による治療・予防と説明									
												2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明									
												3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明									
												4 薬に関しては説明していない									
												平成20年8月1日 改訂									
NO 薬品1		規格		本数		薬品2(規格本数)		時間・投与法													
① ベナ5錠 内服 (前投与 オーダー不要)								② デキサメタゾン同時に内服													
② デキサメタゾン 6.6mg				1.5 本		★生食50mL		①ベナと同時に15分で点滴													
③ グラニセトロン「NK」1mg				1 本		生食100mL		②デキサメタゾン終了後～30分で点滴													
④ パクリタキセルNK()mg		100mg 30mg		本 本		▲5%ブドウ糖250mL		③グラニセトロン終了後～1時間で点滴													
⑤ カルボプラチン「NK」()mg		150mg 50mg		本 本		▲5%ブドウ糖250mL		④パクリタキセル終了後～1時間で点滴													
⑥ 生食50mL				1 本				⑤カルボプラチン終了後～全開で点滴													
⑦ アバステン()mg		400mg 100mg		本 本		生食100mL		生食終了後～主・1時間30分で点滴													
⑧ 生食50mL				1 本				アバステン終了後～主・全開で投与													
【1. 原則禁忌】 ●脳転移患者(脳出血のおそれ) 【2. 投与前必須検査】 ●投与前・後に血圧測定 BP180/120を超える場合は主治医へ報告 ●アバステン検査セット(●血液算定●T-Bil●GOT●GPT●ALP●ALB●Scr●CRP●尿蛋白測定●PT-INR●APTT●フィブリノーゲン●D-ダイマー)																					
【看護師注意事項】 ○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用																					
【外来時、嘔気強い場合、シンセロン錠投薬考慮】																					
												201608									
月日		指示		指示医		受け		監査		払い		私監		調製		調監		前確		実施	
		①～⑧ DAY1																			
		①～⑥ DAY8																			
		①～⑥ DAY15																			
		休み DAY22																			