

NO **5009** レジメン名 **Weekly DC**

| | | | | | |
|------------|----|------|----|----------------|-------------------|
| 病棟 患者番号 氏名 | 癌種 | ステージ | PS | クール数 | 指示医師名 |
| | | | | | |
| | 年齢 | 身長 | 体重 | 体表面積 | GFR(血清クレアチニン値) |
| | 歳 | cm | kg | m ² | ml/min (mg/dl) |

| | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|---------|---|
| 【適応がん種】 卵巣K | DOC/CBDCA | CCr補正 | GOT補正 | T-Bil補正 | 【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂 |
| 1・ドセタキセル 25 mg/m ² DAY1. 8. 15 | | - | - | - | |
| 2・カルボプラチン AUC1.5~2 DAY1. 8. 15 【カルバトートの式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】 | | カルバート使用 | - | - | |
| ★アルコール含有説明要 28日(4週)1クール | | WBC基準 | HGB基準 | PLT基準 | |

| NO | 薬品1 | 規格 | 本数 | 薬品2(規格本数) | 時間・投与法 |
|----|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------------|
| ① | デキサメタゾン 6.6mg グラニセトロン「NK」1mg | | 1 本 1 本 | 生食50mL | 15分で点滴 |
| ② | ドセタキセル()mg | 80mg 20mg | 本 本 | ▲5%ブドウ糖250mL | ①グラニセトロン終了後～ 1時間で点滴 |
| ③ | カルボプラチン「NK」()mg | 150mg 50mg | 本 本 | ▲5%ブドウ糖250mL | ②ドセタキセル終了後～ 1時間で点滴 |
| ④ | 生食50mL | | 1 本 | | ③カルボプラチン終了後～ 全開で点滴 |

【外来時、嘔気強い場合、シンセロン錠投薬考慮】

| ★27万円/28日1クール | | | ★2時間15分 | | | 200807更新 | | | | |
|---------------|-----|-------|---------|----|----|----------|----|----|----|----|
| 月日 | 指示 | 指示医 | 受け | 監査 | 払い | 払監 | 調製 | 調監 | 前確 | 実施 |
| | ①～④ | DAY1 | | | | | | | | |
| | ①～④ | DAY8 | | | | | | | | |
| | ①～④ | DAY15 | | | | | | | | |
| | 休み | DAY22 | | | | | | | | |