

NO 5027		レジメン名 CPT-11/CDDP(裏面あり)					
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名		
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)			
歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)			
【適応がん種】卵巣K		CPT-11/CDDP		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月11日 改訂
1・イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	DAY1. 8. 15		60~	-	-	
2・シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	DAY1		60~禁30	180~	3.1~禁5.1	
28日(4週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準	
NO 薬品1		規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法	
① イメンド125mg内服							
② アロキシバック			1 本			イメンド内服後～全開	
③ デキサメタゾン 6.6mg アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム			1.5 本 2 本 1 本	デノサリン500mL		1時間で点滴	
④ イリノテカン( )mg	100mg 40mg		本 本	5%ブドウ糖500mL		デキサート終了後～ 1時間30分で点滴	
⑤ マンニトール 300mL			1 本			イリノテカン終了後～ 30分で点滴	
⑥ シスプラチン( )mg	50mg 25mg 10mg		本 本 本	【生食250mL】		マンニトール終了後～ 1時間で点滴	
⑦ ヴィーンF500mL			1 本			シスプラチン終了後～ 1時間で点滴	
⑧ ヴィーンF500mL			1 本			ヴィーンF終了後～ 1時間で点滴	
⑨ デノサリン500mL			1 本			ヴィーンF終了後～ 1時間で点滴	
⑩ アロキシバック			1 本			全開で点滴	
⑪ デキサメタゾン 6.6mg			1 本	生食50mL		15分で点滴	
⑫ イリノテカン( )mg	100mg 40mg		本 本	生食500mL		アロキシ終了後～ 1時間30分で点滴	
⑬ 生食50mL			1 本			イリノテカン終了後～ 15分で点滴	
★12万円/28日1クール				★7時間//2時間45分		200807更新	
月日	うら面オーダー必要		指示医	受け	うら面確認必要		
	①～⑨	DAY1					
	⑩～⑬	DAY8					
	⑩～⑬	DAY15					

医師指示表					指示者名	受領者名
月日	指示事項					
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定				↓	
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間					
	↓					
	CDDP当日……………上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服					
★院内セットメニュー 【Chemo CDDP】						
	CDDP翌日から内服				↓	
	デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)	3日分		
	イメンド(80mg)	1Cap	朝食後	2日分		
	吐気時(必要に応じて処方)					
	プリンペラン錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)			