

NO **5025** レジメン名 **Weekly CDDP**

| | | | | | |
|------------|----|------|----------------|-------------------|-------|
| 病棟 患者番号 氏名 | 癌種 | ステージ | PS | クール数 | 指示医師名 |
| 年齢 | 身長 | 体重 | 体表面積 | GFR(血清クレアチニン値) | |
| 歳 | cm | kg | m ² | ml/min (mg/dl) | |

| | | | | | |
|---|------|--------|-------|----------|---|
| 【適応がん種】子宮頸癌(放射線治療と併用) | CDDP | CCr補正 | GOT補正 | T-Bil補正 | 【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂 |
| 1・シスプラチン 25 mg/m ² DAY1. 8. 15. 22. 29. 36. 43 (放射線治療中に週1回投与) | | 60~禁30 | 180~ | 3.1~禁5.1 | |
| 42~49日(6~7週)1クール | | WBC基準 | HGB基準 | PLT基準 | |

| NO | 薬品1 | 規格 | 本数 | 薬品2(規格本数) | 時間・投与方法 |
|----|-------------|------|----|-----------|---------------------------------|
| ① | シスプラチン()mg | 50mg | 本 | ▲生食250mL | 放射線治療終了後～ 側・23時間持続点滴 (遮光) |
| | | 25mg | 本 | | |
| | | 10mg | 本 | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------|-------------|---------------------------|
| ② | グラニセトロン「NK」1mg ホスミンS 2g | | 1 本 1 本 | 生食100mL | 放射線治療終了後～ 主・1時間で点滴 |
| ③ | ソル・コーテフ250mg | | 1 本 | ソルデム3A500mL | ②グラニセトロン終了後～ 主・10時間で点滴 |
| ④ | グラニセトロン「NK」1mg ホスミンS 2g | | 1 本 1 本 | 生食100mL | ③ソル・コーテフ終了後～ 主・1時間で点滴 |
| ⑤ | ソルデム3A500mL | | 1 本 | | ④グラニセトロン終了後～ 主・10時間で点滴 |
| ⑥ | グラニセトロン「NK」1mg ホスミンS 2g | | 1 本 1 本 | 生食100mL | ⑤ソルデム終了後～ 主・1時間で点滴 |

【薬剤部注意事項】.....▲遮光バック添付！！

★12万円/42日1クール ★23時間 200807更新

| 月日 | 指示 | 指示医 | 受け | 監査 | 払い | 払監 | 調製 | 調監 | 前確 | 実施 |
|----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | ①～⑥ | DAY1 | | | | | | | | |
| | ①～⑥ | DAY8 | | | | | | | | |
| | ①～⑥ | DAY15 | | | | | | | | |
| | ①～⑥ | DAY22 | | | | | | | | |
| | ①～⑥ | DAY29 | | | | | | | | |
| | ①～⑥ | DAY36 | | | | | | | | |
| | ①～⑥ | DAY43 | | | | | | | | |