外来 ・ 入院　　指示日;　　年　　月　　日

NO 5031・32 レジメン名　**MTX（子宮外妊娠）**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名

年齢	身長	体重	体表面積	GFR（血清クレアチニン値）
歳	cm	kg	㎡	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】子宮外妊娠　　MTX

1・メソトレキセート　50 mg/㎡　DAY1

静注無効の場合

メソトレキセート　50 mg/body　胎嚢内に局所投与

CCr補正	GOT補正	T-Bil補正
60～禁30	180～	3.1～禁5.1
WBC基準	HGB基準	PLT基準
–	–	–

NO	薬品1	規格	本数	薬品2（規格本数）	時間・投与法
①	デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴
②	メソトレキセート（　　）mg	50mg	本	▲ソルデム1　200mL	デキサメタゾン終了後～30分で点滴
		5mg	本		
③	ハルトマンPH8　500mL		1 本		メソトレキセート終了後～2時間30分で点滴
④	ロイコボリン3mg		5 本	5%ブドウ糖50mL	ハルトマン終了後に全開で点滴

★3時間15分　　200807更新

月日			指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			①②③④　DAY1									

メソトレキセート静注が無効の場合は下記を胎嚢内へ局所投与

⑤	メソトレキセート（　50　）mg	50mg	1 本	蒸留水　2mL	医師局注

次クール予定日【　　】